

## 低用量ピルの種類一覧 (オンライン診療・通販で処方されるもの)


<b>フリウェル配合錠 LD</b>	効果	月経困難症 生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整
	有効成分	ノルエチステロン エチニルエストラジオール
	パール指数	0.19
	主な副作用	頭痛、悪心、上腹部痛、希発月経、月経過多、下腹部痛、過少月経、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、頻発月経、乳房痛、乳房不快感
	飲み方	<p>月経困難症 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、その後7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。</p> <p>生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 1日1錠を毎日一定の時刻に、通常14～21日間経口投与する。</p>
	値段相場	500円
	保険適用	◎
写真出典： <a href="https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/">https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/</a>	添付文書	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1082_1_06/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1082_1_06/</a>

ルナベル配合錠 LD	効果	月経困難症 生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整
	有効成分	ノルエチステロン エチニルエストラジオール
	パール指数	0.19
	主な副作用	頭痛、悪心、上腹部痛、希発月経、月経過多、下腹部痛、 過少月経、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、頻発月経、 乳房痛、乳房不快感
	飲み方	月経困難症 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、 その後7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、 出血が終わっているか続いているかにかかわらず、 29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。  生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 1日1錠を毎日一定の時刻に、通常14～21日間経口投与する。
	値段相場	1,010円
	保険適用	◎
写真出典 : <a href="https://nobelpark.jp/">https://nobelpark.jp/</a>	添付文書	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1031_1_19/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1031_1_19/</a>

トリキュラー錠	効果	避妊
	有効成分	レボノルゲストレル エチニルエストラジオール
	パール指数	0.06～0.22
	主な副作用	下腹部痛、乳房緊満感、悪心、嘔吐、頭痛
	飲み方	<p>トリキュラー錠21 1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って（赤褐色糖衣錠から開始する）21日間連続投与し、7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。</p> <p>トリキュラー錠28 1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って（赤褐色糖衣錠から開始する）28日間連続投与する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。</p>
	値段相場	2,000～3,000円
	保険適用	×
写真出典： <a href="https://pharma-navi.bayer.jp/">https://pharma-navi.bayer.jp/</a>	添付文書	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1047_2_15/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1047_2_15/</a>

ラベルフィーユ	効果	避妊
	有効成分	レボノルゲストレル エチニルエストラジオール
	パール指数	0.06～0.22
	主な副作用	下腹部痛、乳房緊満感、悪心、嘔吐、頭痛
	飲み方	<p>ラベルフィーユ21錠 1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って (赤褐色糖衣錠から開始する)21日間連続投与し、 7日間休薬する。以上28日間を投与1周期とし、 出血が終わっているか続いているかにかかわらず 29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。</p> <p>ラベルフィーユ28錠 1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って (赤褐色糖衣錠から開始する)28日間連続投与する。 以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか 続いているかにかかわらず29日目から次の周期の錠剤を 投与し、以後同様に繰り返す。</p>
	値段相場	2,000～3,000円
	保険適用	×
写真出典： <a href="https://www.fuji-pharma.jp/">https://www.fuji-pharma.jp/</a>	添付文書	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1055_1_11/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1055_1_11/</a>

<p style="text-align: center;"><b>アンジュ</b></p>	<p>効果</p>	<p>避妊</p>
	<p>有効成分</p>	<p>レボノルゲストレル エチニルエストラジオール</p>
	<p>パール指数</p>	<p>0.06～0.22</p>
	<p>主な副作用</p>	<p>悪心、嘔吐、頭痛</p>
	<p>飲み方</p>	<p><b>アンジュ21錠</b> 1周期目は1日1錠を毎日一定の時刻に赤褐色錠から開始し、指定された順番に従い21日間連続経口投与し、7日間休薬する。2周期目は、1周期服用開始29日目より1周期目と同様に赤褐色錠から1日1錠を21日間連続投与し、7日間休薬する。3周期目以降は2周期目と同様に投与する。</p> <p><b>アンジュ28錠</b> 1周期目は1日1錠を毎日一定の時刻に赤褐色錠から開始し、指定された順番に従い28日間連続経口投与する。2周期目は、1周期服用開始29日目より1周期目と同様に赤褐色錠から1日1錠を28日間連続投与し、3周期目以降は2周期目と同様に投与する。</p>
	<p>値段相場</p>	<p>2,000～3,000円</p>
	<p>保険適用</p>	<p>×</p>
<p>写真出典： <a href="https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/">https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/</a></p>	<p>添付文書</p>	<p><a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF3058_1_08/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF3058_1_08/</a></p>

<p style="text-align: center;"><b>マーベロン</b></p>	<p>効果</p>	<p>避妊</p>
	<p>有効成分</p>	<p>デソゲストレル エチニルエストラジオール</p>
	<p>パール指数</p>	<p>0.085</p>
	<p>主な副作用</p>	<p>乳房痛、悪心、頭痛</p>
	<p>飲み方</p>	<p>マーベロン21 1日1錠を毎日一定の時刻に計21日間連続経口投与し、その後7日間休薬する。同様の方法で、避妊する期間繰り返し投与する。</p> <p>マーベロン28 1日1錠を毎日一定の時刻に白色錠を21日間連続経口投与し、続けて綠色錠を7日間、合計28日間連続投与する。次周期以降は、消退出血の有無にかかわらず、引き続き白色錠より投与を開始し、28日間連続投与する。したがって、1周期目の投与開始より休薬期間は一切とらない。通常、綠色錠服用中に月経(消退出血)が発来する。</p>
	<p>値段相場</p>	<p>2,000~3,000円</p>
	<p>保険適用</p>	<p>×</p>
<p>写真出典 : <a href="https://organonpro.com/ja-jp/">https://organonpro.com/ja-jp/</a></p>	<p>添付文書</p>	<p><a href="https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910CF1025_3_02/">https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910CF1025_3_02/</a></p>

<p style="text-align: center;"><b>ファボワール</b></p>	<p>効果</p>	<p>避妊</p>
	<p>有効成分</p>	<p>デソゲストレル エチニルエストラジオール</p>
	<p>パール指数</p>	<p>0.085</p>
	<p>主な副作用</p>	<p>乳房痛、悪心、頭痛</p>
	<p>飲み方</p>	<p>ファボワール錠21 1日1錠を毎日一定の時刻に計21日間連続経口投与し、その後7日間休薬する。同様の方法で、避妊する期間繰り返し投与する。</p> <p>ファボワール錠28 1日1錠を毎日一定の時刻に白色錠を21日間連続経口投与し、続けて緑色錠を7日間、合計28日間連続投与する。次周期以降は、消退出血の有無にかかわらず、引き続き白色錠より投与を開始し、28日間連続投与する。したがって、1周期目の投与開始より休薬期間は一切とらない。通常、緑色錠服用中に月経(消退出血)が発来する。</p>
	<p>値段相場</p>	<p>2,000~3,000円</p>
<p>写真出典 : <a href="https://www.fuji-pharma.jp/">https://www.fuji-pharma.jp/</a></p>	<p>保険適用</p>	<p>×</p>
	<p>添付文書</p>	<p><a href="https://www.fuji-pharma.jp/docs/162/document_162.pdf">https://www.fuji-pharma.jp/docs/162/document_162.pdf</a></p>