低用量ピルの副作用と症状の発現率

■保険適用の低用量ピル



	高脂血症、神経過敏、頭重、しびれ感、振戦、抑うつ、 視覚障害(視力低下、視野欠損等)、口渇、胸やけ、食欲亢進、黄疸、 色素沈着、脱毛症、結節性紅斑、四肢痛、筋痙縮、筋骨格硬直、経血量の変化、 帯下の増加、フィブリンDダイマー増加、多汗
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1066_1_05/

ルナベル配合錠 LD



写真出典:https://nobelpark.jp/

重大な副作用	血栓症、アナフィラキシー
副作用(5%以上)	頭痛、悪心、上腹部痛、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、希発月経、月経過多、下腹部痛、過少月経、頻発月経、乳房痛、乳房不快感

副作用(0.1~5%未満)	発疹、薬疹、顔面浮腫、貧血、浮腫、体重増加、体重減少、高プロラクチン血症、 倦怠感、めまい、いらいら感、ふらつき、感覚鈍麻、嗅覚錯誤、眠気、不眠症、 感情不安定、顔面感覚鈍麻、片頭痛、異常感、知覚過敏、睡眠障害、霧視、血圧上昇、 動悸、ほてり、末梢性浮腫、起立性低血圧、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、胃痛、 腹部膨満、鼓腸、胃炎、過敏性腸症候群、胃不快感、歯痛、排便痛、消化管運動障害、 口内炎、食欲不振、痔核、腸炎、腹部不快感、消化不良、胃腸炎、肝機能異常、ざ瘡、 湿疹、蕁麻疹、多形紅斑、アトピー性皮膚炎、女性陰部そう痒症、紅斑、そう痒症、 皮膚乾燥、紫斑、背部痛、尿道炎、尿中蛋白陽性、出血性卵巣嚢胞、卵巣新生物、 卵巣嚢胞、卵巣血腫、卵巣出血、無月経、不規則月経、性器分泌物、子宮肥大、 消退出血不規則、性交出血、子宮類線維腫の変性、子宮平滑筋腫、子宮頸管ポリープ、 月経前症候群、子宮出血、乳房緊満感、乳房萎縮、乳汁分泌、乳癌、乳房腫瘤、 乳汁漏出症、線維嚢胞性乳腺疾患、乳腺線維腺腫、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、 プラスミノーゲン増加、血中トリグリセリド増加、血中コレステロール増加、 血中フィブリノゲン増加、血中・リグリセリド増加、血中コレステロール増加、 血中サガリカ、血中鉄減少、血小板数増加、血中ビリルビン増加、 血中サ、子宮頸部スミア異常、性欲減退、熱感、胸部不快感、炎症性疼痛、 帯状疱疹、副鼻腔炎、齲歯、カンジダ症、鼻炎、髄膜腫、発熱、耳鳴、外陰腟乾燥、 アレルギー性鼻炎
副作用(頻度不明)	高脂血症、神経過敏、頭重、しびれ感、振戦、抑うつ、 視覚障害(視力低下、視野欠損等)、口渇、胸やけ、食欲亢進、黄疸、 色素沈着、脱毛症、結節性紅斑、四肢痛、筋痙縮、筋骨格硬直、経血量の変化、 帯下の増加、フィブリンDダイマー増加、多汗
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2482009F1031_1_19/

■自由診療の低用量ピル



写真出典:https://pharma-navi.bayer.jp/	
重大な副作用	血栓症
副作用(5%以上)	下腹部痛、乳房緊満感、悪心、嘔吐、頭痛
副作用(5%未満)	浮腫、体重増加、下痢、腹痛、めまい、片頭痛、神経過敏、ざ瘡、腰痛、倦怠感・疲労
副作用(1%未満)	発疹、じん麻疹、肝機能異常、帯下の増加、カンジダ膣炎、乳房痛、動悸、血圧上昇、 便秘、食欲不振、食欲亢進、ロ内炎、口渇、眠気、抑うつ、褐色斑、湿疹、肩こり、 息切れ、性欲減退、鼻出血
副作用(頻度不明)	網膜血流障害による視力障害、黄疸、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、色素沈着、 しびれ、総コレステロール上昇、トリグリセリド上昇
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1047_2_15/

ラベルフィーユ





写真出典:https://www.fujipharma.jp/	
重大な副作用	血栓症
副作用(5%以上)	下腹部痛、乳房緊満感、悪心、嘔吐、頭痛
副作用(5%未満)	浮腫、体重増加、下痢、腹痛、めまい、片頭痛、神経過敏、ざ瘡、腰痛、倦怠感・疲労
副作用(1%未満)	発疹、じん麻疹、肝機能異常、帯下の増加、カンジダ膣炎、乳房痛、動悸、血圧上昇、 便秘、食欲不振、食欲亢進、口内炎、口渇、眠気、抑うつ、褐色斑、湿疹、肩こり、 息切れ、性欲減退、鼻出血
副作用(頻度不明)	網膜血流障害による視力障害、黄疸、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、色素沈着、 しびれ、総コレステロール上昇、トリグリセリド上昇
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF1055_1_11/

アンジュ





写真出典:https://www.aska-pharma.co.jp/iryouiyaku/	
重大な副作用	血栓症
副作用(5%以上)	悪心、嘔吐、頭痛
副作用(0.1~5%未満)	発疹、肝機能障害、浮腫、体重増加、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、 白帯下、下腹部痛、乳汁分泌、乳房痛、乳房緊満感、乳房萎縮、乳房腫大、 血圧上昇、動悸、下痢、食欲不振、胃痛、便秘、眠気、神経過敏、めまい、ざ瘡、 肩こり、腰痛、倦怠感
副作用(頻度不明)	網膜血流障害による視力障害、黄疸等、経血量変化、カンジダ腟炎、口渇、 ロ内炎、腹痛、食欲亢進、抑うつ、色素沈着、冷感、しびれ、代償性鼻出血、 熱感、総コレステロール上昇、トリグリセリド上昇
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910BF3058_1_08/

マーベロン





写真出典:https://organonpro.com/ja-jp/	
重大な副作用	血栓症
副作用(5%以上)	乳房痛、悪心、頭痛
副作用(0.1~5%未満)	発疹、視力障害、肝機能異常、AST上昇、ALT上昇、ナトリウムや体液の貯留による 浮腫、体重増加、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、帯下、月経過多、月経痛、 性交痛、リビドー減退、乳房緊満(感)、期外収縮、血圧上昇、動悸、嘔吐、下痢、 腹痛、便秘、食欲減退、胸やけ、腹部膨満感、咽頭痛、咳嗽、めまい、眠気、ざ瘡、 湿疹、そう痒感、色素沈着、紅斑、腰痛、下肢痛、肩こり、手指のこわばり、倦怠感、 口渇、顔面浮腫、胸痛、白血球減少、アルドステロン上昇
副作用(頻度不明)	網膜血流障害による視力障害、黄疸、乳汁漏出、抑うつ、いらいら感、片頭痛、脱毛、 血管性浮腫
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910CF1025_3_02/

ファボワール





写真出典:https://www.fujipharma.jp/

5 XIII X	
重大な副作用	血栓症
副作用(5%以上)	乳房痛、悪心、頭痛
副作用(0.1~5%未満)	発疹、視力障害、肝機能異常、AST上昇、ALT上昇、ナトリウムや体液の貯留による 浮腫、体重増加、不正性器出血(破綻出血、点状出血)、帯下、月経過多、月経痛、 性交痛、リビドー減退、乳房緊満(感)、期外収縮、血圧上昇、動悸、嘔吐、下痢、 腹痛、便秘、食欲減退、胸やけ、腹部膨満感、咽頭痛、咳嗽、めまい、眠気、ざ瘡、 湿疹、そう痒感、色素沈着、紅斑、腰痛、下肢痛、肩こり、手指のこわばり、倦怠感、 口渇、顔面浮腫、胸痛、白血球減少、アルドステロン上昇
副作用(頻度不明)	網膜血流障害による視力障害、黄疸、乳汁漏出、抑うつ、いらいら感、片頭痛、脱毛、 血管性浮腫
添付文書	https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/254910CF2030_1_01/?view=frame&style=XML⟨=ja