

風疹・麻疹 抗体検査判定結果表

※ひなたクリニックではE I A法(酵素抗体法)を採用しております。

●風疹抗体判定結果●

E I A法で8. 0未満の方は『抗体価が低い方』です。

風疹の感染予防に十分な抗体がなく、風疹にかかる可能性があります。

風疹を予防するために「風疹ワクチン」の接種をご検討下さい。

E I A法で8. 0以上の方は『十分な抗体を持っています』

風疹の感染予防に十分な抗体を持っていると考えられます。

現在は、風疹にかかる心配はありません。

●麻疹抗体判定結果●

E I A法で8. 0未満の方は『抗体価が低い方』です。

麻疹の感染予防に十分な抗体がなく、麻疹にかかる可能性があります。

麻疹を予防するために「麻疹ワクチン」の接種をご検討下さい。

E I A法で8. 0以上の方は『十分な抗体を持っています』

麻疹の感染予防に十分な抗体を持っていると考えられます。

現在は、麻疹にかかる心配はありません。



●ワクチンについて●

- 【風疹ワクチン】
 - ・妊娠の可能性がある場合、妊娠中は予防接種を受けられません。
 - ・女性の場合、接種後2ヶ月は避妊が必要です。
- 【麻疹ワクチン】
 - ・妊娠の可能性がある場合、妊娠中は予防接種を受けられません。
 - ・女性の場合、接種後2ヶ月は避妊が必要です。
- 【MRワクチン】
 - ・麻疹風疹の混合ワクチンです。
 - ・妊娠の可能性がある場合、妊娠中は予防接種を受けられません。
 - ・女性の場合、接種後2ヶ月は避妊が必要です。

医療法人社団みぶな会 産科・婦人科ひなたクリニック 担当医：三橋 裕一

札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル3F
TEL：011-204-8000 FAX：011-204-8001